

En cas de détresse vitale

MALAISE / PERTE DE CONNAISSANCE

Vérifier le pouls et la respiration, débiter si nécessaire les gestes de première urgence pendant qu'une autre personne appelle le 15.

L'enfant respire, son cœur bat : installer l'enfant en position latérale de sécurité (PLS) ou en position allongée avec les jambes surélevées si possible, une personne surveille l'enfant.

CONVULSIONS

Installer l'enfant au sol et retirer tout objet à sa portée. Prendre sa température, noter l'heure de début et de fin des convulsions.

Si PAI existe, suivre le protocole défini.

APPELER LE 15.

INHALATION DE CORPS ETRANGER

L'enfant respire : ne rien tenter, ne pas le manipuler, l'assoir au sol, le rassurer et le calmer, ne pas le laisser seul, une autre personne appelle le 15.

L'enfant ne respire pas/suffoque : effectuer les manœuvres de libération des voies respiratoires, appeler le 15.

HEMORRAGIE

Compresser la zone qui saigne avec un linge propre sans gêner les voies respiratoires, ne pas poser de garrot. Appeler le 15.

Fièvre, Asthme, Diarrhée et vomissement

FIEVRE A 38.5 OU PLUS

Administrer PARACETAMOL par voie orale uniquement, selon prescription du médecin traitant, toutes les 6h.

Autres formes interdites. Appeler les parents avant de donner le paracétamol.

En cas de signe de mauvaise tolérance : somnolence, délire, cyanose, membres froids ou marbrés : APPELER LE 15.

Coups de chaud (soleil) : mettre l'enfant au frais et au calme, utilisez un linge mouillé frais.

DIARRHEE OU VOMISSEMENTS

Prendre la température, si supérieure à 38.5°, appliquer le protocole.

Proposer fréquemment des petites quantités d'eau.

Diarrhée ou vomissements isolés : simple information aux parents.

Diarrhée ou vomissements répétés : appeler les parents

Altération de la vigilance, de l'état général : APPELER LE 15.

DIFFICULTES RESPIRATOIRES

Vérifier si possible l'absence de corps étranger dans la bouche.

Crise peu sévère : sifflements, toux ou essoufflements modérés

Si PAI existe, l'appliquer

En l'absence de PAI, appeler les parents

Crise sévère : sifflements, toux, essoufflements importants

Appliquer le PAI s'il existe et appeler le 15.

ORL

ŒIL ROUGE

Corps étranger : lavage de l'œil au SERUM PHYSIOLOGIQUE, si le corps étranger ne peut être retiré avec le produit, faire un pansement occlusif (compresses et sparadrap) et appeler les parents pour une consultation d'ophtalmologie en urgence.

Origine infectieuse probable :

En l'absence de douleur : lavage au SERUM PHYSIOLOGIQUE toutes les 3h, information aux parents et retour en collectivité selon le règlement intérieur.

Œil rouge douloureux : Appeler le 15.

SAIGNEMENT DE NEZ

Faire tenir la tête penchée en avant.

Comprimer la narine qui saigne 10 minutes sans relâcher, appliquer un gant froid et compresser le nez pour arrêter le saignement.

Si très important, appeler les parents

Si le saignement persiste, appeler le 15.

RHINORRHEE

Allonger l'enfant sur le dos

Tenir doucement la tête plaquée sur le côté. Instiller du sérum physiologie par la narine supérieure. Ce dernier doit s'écouler par la narine inférieure. Laver par l'autre narine n'est pas obligatoire.

A faire avant chaque repas et chaque coucher.

Problèmes cutanés

ERUPTION CUTANEE

Sans altération de l'état général : Surveillance et information aux parents, retour en collectivité selon le règlement intérieur.

Avec altération de l'état général : APPELER le 15 immédiatement.

OEDEME DU VISAGE : YEUX, LEVRES, LANGUE

Si un PAI existe, l'appliquer et APPELER LE 15 immédiatement

PIQURE D'INSECTE

Retrait du dard à la pince à épiler (abeilles)

Appliquer un glaçon quelques minutes et désinfecter à la BISEPTINE.

BRULURE

Rincer à l'eau tempérée (20°) pendant 10 à 15 minutes.

Envelopper la partie brûlée d'un linge propre

Administrer du PARACETAMOL selon le protocole fièvre

Appeler le 15.

En cas de brûlure grave (œil, muqueuses, étendue) : rincer et appeler le 15 immédiatement.

TRAUMATISMES

TRAUMATISME CRANIEN

Traumatisme grave (troubles de la conscience ou perte de connaissance) : si l'enfant est au sol, ne pas le mobiliser, sinon l'allonger en PLS et appeler le 15 en le surveillant constamment.

Traumatisme léger (Céphalée, contusion simple) : appliquer un glaçon, administrer le PARACETAMOL selon le protocole fièvre, en cas de nouveaux signes (vomissements, ...) : appeler le 15.

Surveillance de l'enfant jusqu'à 72h après le traumatisme (à noter sur le cahier de transmission). Si altération de l'état de conscience, appeler le 15.

PLAIE DE LA LEVRE

Mettre des gants jetables.

Plaie simple : simple compression avec une compresse stérile jusqu'à l'arrêt du saignement.

Plaie délabrante : compression avec une compresse stérile et appel des parents pour une consultation aux urgences.

PLAIES CUTANÉES

Mettre des gants jetables

Plaie punctiforme / inférieure à 5mm : Rinçage à la BISEPTINE, puis simple compression avec une compresse stérile jusqu'à l'arrêt du saignement.

Plaie supérieure à 5 mm : Rinçage à la BISEPTINE, compression avec une compresse stérile et appeler le 15.

Mis à jour par le Dr Bodin, le 20/09/2023

